

Інформована згода

на встановлення внутрішньоматкової спіралі (ВМС)

Я, фізична особа, яка беззастережно прийняла (акцептувала) умови, викладені в цьому договорі, цим підтверджую факт надання усвідомленої згоди на встановлення внутрішньоматкової спіралі.

Мене повідомлено, що внутрішньоматкова спіраль – це м'яка невеличка пластикова трубка з двома відростками. Відростки перекривають прохід до маткових труб, цим самим не допускаючи сперматозоїди. Ця трубка може містити спеціальні речовини (наприклад прогестерол), які пригнічують життєдіяльність сперматозоїда та не допускають його до зрілої яйцеклітини, впливають на слизову оболонку.

Внутрішньоматкова спіраль одночасно надає кілька ефектів. ВМС:

- перешкоджає проникненню сперматозоїдів у матку;
- пригнічує овуляцію (більшість спіралей прискорюють рух яйцеклітини по матковій трубці та не дають їй дозріти для запліднення);
- впливає на розвиток ендометрію, а також подразнює слизову матки, що перешкоджає імплантації яйцеклітини, якщо раптом сталося запліднення.

Спіраль забезпечують максимальний захист від вагітності. Після її видалення фертильні функції жінки відновлюються.

Лікар пояснив мені, що перевагами ВМС є:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • високий показник ефективності ВМС (98%); • відсутність потреби якихось щоденних процедур (наприклад щоденному прийомі гормонів); • безпека для пацієнтки; • збереження інтимної близькості та повноти відчуттів; • відсутність будь-якого відчуття стороннього тіла як для жінки, так і для її партнера; | <ul style="list-style-type: none"> • доступність у ціні (економія у порівнянні з систематичною покупкою презервативів); • мізерний ризик ускладнень; • довготривала ефективність (до 8-10 років); • можливість повного відновлення фертильності за бажанням пацієнтки. |
|--|--|

Я підтверджую, що до початку лікування мені у повністю зрозумілому та доступному вигляді була надана інформація стосовно стану мого здоров'я, поставленого діагнозу, можливого прогнозу, найбільш ефективних для мене методів лікування, а також ризиків і ускладнень запланованих медичних втручань.

Мене повідомлено, що перед введенням ВМС рекомендовано пройти ряд обстежень:

- огляд у дзеркалах та відеокольпоскопія, щоб візуально побачити, чи нема протипоказань до ВМС;
- мазок з шийки матки, піхви та уретри для дослідження мікрофлори;
- мазок на атипові клітини або ПАП-тест;
- бактеріоскопію мазків або ПЛР для виявлення збудників сечостатевих інфекцій;
- тест на вагітність;
- гінекологічне УЗД (матки, яєчників).

Лікар повідомив мені основні недоліки ВМС, а саме:

- відсутність захисту від інфекцій, які передаються статевим шляхом;
- тимчасове збільшення менструальних виділень;
- вплив на гормональний фон, хоч і невеликий;
- ризик позаматкової вагітності;
- ризик розвитку ендометріозу;
- ймовірність запліднення яйцеклітини та відторгнення ембріона (відбувається викидень);
- необхідність регулярно контролювати наявність нитки спіралі у піхві;

- можливість випадіння спіралі.

Я погоджуюся на тип анестезії за вибором лікаря. Я проінформована про можливі ускладнення під час анестезії та при прийомі анальгетиків і антибіотиків. Я надала лікарю всю відому мені інформацію щодо стану мого здоров'я, наявних захворювань відповідно до анкети пацієнта та повідомила про всі алергічні реакції на медичні препарати та анестетики, що мали місце. У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час втручання я заздалегідь даю згоду на застосування всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

Мене повідомлено, та я підтверджую відсутність у мене наступних протипоказань до проведення процедури:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - структурні аномалії матки; | - поліпи ендометрію; |
| - фіброміоми, які деформують матку; | - сильний біль під час менструації; |
| - злоякісні новоутворення; | - захворювання серця; |
| - маткові кровотечі; | - алергія на компоненти спіралі. |
| - гіперплазія ендометрію; | |

Тимчасовими протипоказаннями також є запальні та інфекційні захворювання статеві системи, гострі захворювання (простуда, грип) і загострення хронічних патологій. Лікар проінформував мене, що внутрішньоматкові спіралі не рекомендують встановлювати молодим жінкам, які ще не народжували або планують вагітність найближчим часом.

Я розумію, що хірургічне лікування є втручанням в біологічну систему організму, в якому всі процеси протікають індивідуально, та, як будь-яка медична операція, не може мати стовідсоткової гарантії на успіх, навіть при ідеальному виконанні всіх етапів. Протягом декількох днів після установки контрацептиву можуть бути легкі болі внизу живота та мажучі виділення. Також можливе збільшення тривалості і об'єму менструальних виділень. Зазвичай, стан нормалізується після 3-4 циклів.

Після установки ВМС рекомендують:

- відпочити у Медичному центрі 30-60 хвилин після процедури;
- 5-10 днів утримуватися від статевих контактів;
- на 1 тиждень відмовитися від важких фізичних навантажень;
- при сильному болю, рясній кровотечі, менструації понад 7 днів обов'язково звернутися до лікаря;
- кожні 3 місяці проходити плановий огляд у гінеколога;
- перші дні після менструації перевіряти наявність нитки у піхві (в ці дні підвищується ризик випадіння внаслідок розширення шийки матки).

Текст цього документу мною прочитано та я повністю погоджуюсь зі всім, що в ньому зазначено. Я розумію, що ця згода є юридичним документом і тягне для мене правові наслідки.