

Інформована згода на проведення

оперативного втручання з метою лікування фімозу

Я, фізична особа, яка беззастережно прийняла (акцептувала) умови, викладені в цьому договорі, цим підтверджую факт надання усвідомленої згоди на хірургічне втручання з метою лікування фімозу. Лікар пояснив мені, що фімоз – це звуження крайньої плоті, за якого відкриття головки статевого члена стає ускладненим, болючим чи неможливим. Фімоз у чоловіків може супроводжуватися хворобливою ерекцією, а також ускладнює гігієну статевих органів. Симптомом фімозу за вираженого звуження крайньої плоті у чоловіка також може бути утруднене сечовипускання.

Я підтверджую, що до початку лікування мені у повністю зрозумілому та доступному вигляді була надана інформація стосовно стану мого здоров'я, поставленого діагнозу, можливого прогнозу, найбільш ефективних для мене методів лікування, а також ризиків і ускладнень запланованих медичних втручань.

Я повністю зрозумів мету та характер медичних втручань, їх лікувальний та естетичний ефект. Я мав можливість поставити всі питання, що мене цікавили, та отримати на них повні, зрозумілі для мене відповіді.

Мені повідомлено, що фімоз небезпечний розвитком ускладнень і супутніх захворювань сечостатевої системи. Наслідками фімозу можуть стати інфекційно-запальні захворювання статевого члена (гнійний фімоз, баланіт, баланопостит), інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів (уретрит, цистит, пієлонефрит), підвищений ризик зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ-інфекцією. Ускладненням фімозу може стати статевая дисфункція (імпотенція). Імпотенція за фімозу пов'язана з хворобливою ерекцією.

Найбільш небезпечним ускладненням фімозу є розвиток парафімозу. Парафімоз — це стан, за якого відкриття головки статевого члена стає неможливим, а крайня плоть перетискає пеніс. Крайня плоть перетискає пеніс, внаслідок чого порушується відтік крові, розвивається набряк, з'являються болючі відчуття. Парафімоз може призвести до некрозу (відмирання) частини статевого органу. Лікар пояснив мені альтернативні способи лікування, однак я розумію, що найбільш ефективним способом лікування є хірургічне втручання.

Показання до оперативного лікування фімозу включають:

- часті баланопостити (запалення головки статевого члена та крайньої плоті);
- повторні епізоди інфекцій сечовивідних шляхів;
- еректильну дисфункцію;
- рубцеву форму фімозу.

Мене повідомлено, та я підтверджую відсутність у мене наступних протипоказань до проведення процедури:

- гостра серцево-судинна недостатність або хронічна серцева недостатність IV функціонального класу;
- гострий баланопостит;
- патологічні виділення з уретри.

Я повністю усвідомлюю та погоджуюсь з наступним:

Хірургічне лікування є втручанням в біологічну систему організму, в якому всі процеси протікають індивідуально, та, як будь-яка медична операція, не може мати стовідсоткової гарантії на успіх, навіть при ідеальному виконанні всіх етапів. Я погоджуюся на тип анестезії за вибором лікаря. Я проінформований

про можливі ускладнення під час анестезії та при прийомі анальгетиків і антибіотиків. Я надав лікарю всю відому мені інформацію щодо стану мого (моєї дитини) здоров'я, наявних захворювань відповідно до анкети пацієнта та повідомив про всі алергічні реакції на медичні препарати та анестетики, що мали місце. У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час втручання я заздалегідь даю згоду на застосування всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

Операція з видалення крайньої плоти проводиться під загальною анестезією і триває близько 30 хвилин. Обрізання крайньої плоти проводиться амбулаторно, за кілька годин після втручання пацієнту можна повертатися додому.

Період відновлення після операції з обрізання крайньої плоти займає 2-3 тижні. У перші дні після циркумцизії можуть з'явитися набряклість пеніса та болочі відчуття. Для зменшення дискомфорту у післяопераційному періоді застосовуються знеболювальні препарати, до паху прикладається холод. Протягом 10-14 днів після обрізання необхідно щодня або раз на два дні за призначенням лікаря робити перев'язки та змінювати пов'язку. Шви після циркумцизії розсмоктуються самостійно. Через 2-3 тижні після видалення крайньої плоти можна відновити статеве життя.

Текст цього документу мною прочитано та я повністю погоджуюсь зі всім, що в ньому зазначено. Я розумію, що ця згода є юридичним документом і тягне для мене правові наслідки.

Giorno Dentale