

Додаток 23
до Публічного договору
про надання медичних послуг

**Інформована згода на проведення
втручання при вкороченій вуздечці**

Я, фізична особа, яка беззастережно прийняла (акцептуала) умови, викладені в цьому договорі, цим підтверджую факт надання усвідомленої згоди на хірургічне втручання при вкороченій вуздечці.

Коротка вуздечка - це утворення у вигляді поздовжньої складки, яка з'єднує крайню плоть з голівкою статевого члена. Це призводить до порушення функцій пеніса, і може бути як вродженою патологією, так і результатом травмування пеніса.

Я підтверджую, що до початку лікування мені у повністю зрозумілому та доступному вигляді була надана інформація стосовно стану моого здоров'я, поставленого діагнозу, можливого прогнозу, найбільш ефективних для мене методів лікування, а також ризиків і ускладнень запланованих медичних втручань.

Я повністю зрозумів мету та характер медичних втручань, їх лікувальний та естетичний ефект. Я мав можливість поставити всі питання, що мене цікавили, та отримати на них повні, зрозумілі для мене відповіді.

У стані спокою вкорочення шкірної складки не приносить дискомфорту, але в стані ерекції виникають такі симптоми:

- відчуття сильного натягу з супутнім бальовим синдромом;
- викривлення пеніса в стані ерекції (прогинається в сторону мошонки);
- передчасна еякуляція;
- тріщини, надриви і розриви короткої вуздечки з наступною кровотечею;
- застій смегми і розвитком запальних процесів.

Лікар пояснив мені альтернативні способи лікування, однак я розумію, що найбільш ефективним способом лікування є хірургічне втручання.

Операція проводиться в амбулаторних (поліклінічних) умовах, стерильно під місцевою анестезією. Залежно від методу, час операції варіє від 5 до 20 хвилин.

Показання, при яких необхідна пластика вуздечки:

- Дискомфорт і біль під час ерекції;
- Надрив і розрив вуздечки, кровотеча;
- Рубець вуздечки;
- Передчасна еякуляція;
- Викривлення члена.

Мене повідомлено, та я підтверджую відсутність у мене наступних протипоказань до проведення процедури:

- місцеві інфекції,
- гострі запальні стани,
- патологія згортання крові,
- злюкісні новоутворення,
- гостра печінкова та ниркова недостатність.

Мене проінформовано, що відсутність лікування призводить до негативних наслідків, зокрема:

- Якщо наявність такої аномалії залишити без лікування, то з часом коротка вуздечка крайньої плоті призведе до неприємних наслідків: виникнення сильних болів при ерекції.
- Нездатність до повного оголення голівки призводить до швидкого накопичення в мішечку смегми. Це секрет, який виділяє крайня плоть.
- При недбалому здійсненні гігієнічних процедур і несвоєчасному видаленні секрету існує ймовірність розвитку вираженого запального процесу.
- Якщо до виправлення патології не вживати ніяких заходів, недуга буде заважати здійсненню статевого акту. При цьому можлива миттева еякуляція.

- У деяких випадках коротка вузечка крайньої плоті здатна призвести до повної або часткової еректильної дисфункції.

Я повністю усвідомлюю та погоджуєсь з наступним:

Хіургічне лікування є втручанням в біологічну систему організму, в якому всі процеси протікають індивідуально, та, як будь-яка медична операція, не може мати стовідсоткової гарантії на успіх, навіть при ідеальному виконанні всіх етапів. Я погоджуєсь на тип анестезії за вибором лікаря. Я проінформований про можливі ускладнення під час анестезії та при прийомі анальгетиків і антибіотиків. Я надав лікарю всю відому мені інформацію щодо стану мого (моєї дитини) здоров'я, наявних захворювань відповідно до анкети пацієнта та повідомив про всі алергічні реакції на медичні препарати та анестетики, що мали місце. У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час втручання я заздалегідь даю згоду на застосування всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

Після операції перебування чоловіка в лікарні не потрібне. Рана загоюється без утворення рубців. Можлива поява невеликої кровотечі протягом 2-3 діб після проведеної пластики. Після операції протягом кількох днів рекомендується застосування зволожуючого крему, а також промивання крайньої плоті два рази в день, якщо область вузечки не розширенна. Відновлення статевого життя стає можливим через 2-3 тижні після проведеної операції.

Текст цього документу мною прочитано та я повністю погоджуєсь зі всім, що в ньому зазначено. Я розумію, що ця згода є юридичним документом і тягне для мене правові наслідки.

Giorino Dentale